

СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ

Легкая степень адаптации	Средняя степень адаптации	Тяжелая степень адаптации
<ul style="list-style-type: none"> - Поведение ребенка нормализуется в течение 1-2 недель. - Острых заболеваний не возникает (до 10 дней однократно, может совсем не быть) - Appetit и сон нормализуются к концу 1 или 2 недели. - У ребенка преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное состояние; он активно контактирует со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро привыкает к новым условиям. - Масса тела и рост не изменены. 	<ul style="list-style-type: none"> - Поведение ребенка нормализуется через 20-40 дней. - Заболеваемость может длиться 10 дней, может быть повтор болезни. - Appetit и сон восстанавливаются через 20-40 дней; в течение периода может наблюдаться отсутствие аппетита, кратковременность сна. - В течение всего периода настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребенка нестабильно, новый раздражитель способствует отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче привыкает к новой ситуации. - Потеря массы тела и роста в течение 30-40 дней. 	<ul style="list-style-type: none"> - Поведение ребенка нормализуется через 2-6 месяцев. - Длительные, тяжелые заболевания, могут быть с осложнениями. - Appetit и сон нормализуются к концу 2-6 месяцев (отказ от еды, беспокойно спит или вообще не спит, мочится в постель). - У ребенка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации (двигательные протест, агрессивные действия): активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик); либо отсутствует активность при более или менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). - Резкое замедление массы тела и темпа роста.